

Reg. Agricol

Comuna ONCEȘTI-Jud. BACĂU	
INTRARE	Nr. 2846
IEȘIRE	
Ziua 02	Luna 09 Anul 2026



OFICIUL FITOSANITAR BACĂU, Str Alexandru Piru nr. 153, Bacău, Județul Bacău, Tel: 0234.211.721, Email: ofbacau@anfor.ro

Buletin de informare

Conform Notificării ANSA nr. 11-4796/2026, în Republica Moldova a fost semnalată prima detectare oficială a specie *Lycorma delicatula*, dăunător de carantină pentru Uniunea Europeană. Focarul a fost identificat pe una din plantele gazdă, cenușar (*Ailanthus altissima*) și supus protocolului de eradicare.

Pentru România, aflată în proximitatea focarului, există un risc de introducere și răspândire a dăunătorului — motiv pentru care informarea producătorilor agricoli, depistarea timpurie a dăunătorului și raportarea imediată către Autoritatea Națională Fitosanitară sunt etape care pot face diferența dintre un focar izolat și o răspândire greu de eradicat.

Descrierea speciei

Lycorma delicatula, cunoscută internațional sub denumirea de *spotted lanternfly*, este originară din China, Taiwan și Vietnam și s-a extins ulterior în Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite ale Americii.

Stadiu: Ou



Perioada: Octombrie – Mai

Mase de 30–50 de ouă, acoperite cu o secreție ceroasă cenușiu-maronie, cu aspect de noroi uscat și crăpat, depuse pe scoartă sau pe obiecte netede.



Stadiu: Adult
Perioada: Iulie – Noiembrie

Corp de aprox. 25 mm lungime, cu aripi anterioare cenușii cu pete negre și aripi posterioare cu pete roșii vizibile în zbor



Stadiu: Nimfă I-III

Perioada: Mai – Iulie


Corp de 3,5–9 mm, negru, cu pete albe distincte pe corp și picioare; foarte agile și săritoare.

Stadiu: Nimfă IV

Perioada: Iulie - August

Corp de 11–15 mm, roșu aprins, cu pete albe și dungi negre.

Prin amplasarea de capcane lipicioase sau de tip „circle trunk” pe arborii gazdă, în special pe cenușar (*Ailanthus altissima*) se pot captura indivizii care cad ușor din copaci.



Lycorma delicatula este un dăunător polifag care se hrănește în principal cu plante lemnoase, inclusiv vița de vie (*Vitis* spp.), pomi fructiferi (de exemplu, măr, păr, prun, etc), arbori ornamentali și forestieri (de exemplu, arțar, mesteacăn, plop, stejar, salcâm, salcie, etc). Planta-gazda preferată este cenușarul (*Ailanthus altissima*).

Dăunătorul se hrănește cu seva din floem determinând ofilirea lăstarilor, slăbirea generală a plantei și uscarea acestora. Excreția masivă de rouă de miere determină dezvoltarea fumaginei, reducând totodată și procesul de fotosinteză. În plantațiile viticole și pomicole, efectul este direct economic: recolte reduse, acumulare scăzută de zaharuri, deprecierea calității fructelor și uscarea butucilor de viță-de-vie.

Răspândirea dăunătorului pe distanțe lungi are loc prin transportul ouălor: depunerea pontei pe plante și suporturi inerte care sunt transportate internațional (mase de ouă camuflate pe tulpini, ambalaje din lemn, palet, piatră de carieră, containere și vehicule). De acest motiv, controlul materialului lemnos, al mijloacelor de transport și al mărfurilor provenite din zone afectate reprezintă prima linie de apărare.

Raportați orice suspiciune la Oficiul Fitosanitar Bacău sau la Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF).

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa Oficiului Fitosanitar Bacău la tel: 0234.211.721 e-mail: ofbacau@anf.ro

Coordonator Oficiul Fitosanitar Zonal Bacău-Neamț
Zaharia Gheorghe

